

Leptotes bicolor

Pasaulyje, tuo pačiu ir Lietuvoje, daugėja orchidėjų augintojų. Kai kas šiuos nuostabius augalus atranda tik dabar, o kai kas jų vazonėliais jau apstatė visas palanges. Augintojai kolekcionieriai, norėdami turėti kuo daugiau ir kuo įvairesnių augalų, dėl vietos stokos nejučiomis pradeda dairytis į vidutinio ar mažo dydžio augalus. Vienas tokių yra Leptotes bicolor.

Šis gegužraibinių šeimos augalas yra ne tik mažo dydžio, sukraunantis neproporcingai didelius žiedus,

bet ir turintis gana neįprastus orchidėjoms lapus. *Leptotes bicolor* buvo atrasta 1833 metais. Natūraliai gamtoje auga Paragvajuje ir Brazilijoje subtropiniuose drėgnuose atogrąžų miškuose ir pakrantės kalnuose aukštyje nuo 500 iki 900 metrų.

Leptotes bicolor gumbeliai yra labai maži, iki 1,5 cm dydžio, gumbas turi vieną lapą, kuris daugiau panašus į storą smailėjantį spyglį; lapo ilgis siekia iki 12 – 13 cm. Lapo viduriu per visą ilgį eina vagelė, kurios susidūrimu su gumbu išauga žiedstiebis. Žiedstiebio ilgis iki 2 cm. Žiedai, kurių būna nuo vieno iki trijų, yra 3,5 – 5 cm dydžio. Taurėlapiai ir

vaniklapiai yra balti, o lūpa ryškios violetinės spalvos (kartais pasitaiko ir kitokių atspalvių). Žiedai kvepia. Taip pat galima įsigyti ir alba formą, tačiau ji yra pakankamai reta. Daugelis augintojų pataria šią orchidėją auginti pritvirtintą prie medžio žievės bloko. Turint orchidariumą ar esant pakankamam oro drėgnumui tai visai nesudėtinga, tačiau jeigu tai neįmanoma, *Leptotes bicolor* atsisakyti tikrai neverta – ji sėkmingai augs moliniame vazonyje. Prieš sodindami augalą prigręžkite papildomų skylučių vazonėlio šonuose, taip užtikrinsite oro judėjimą ir greitesnį substrato pradžiuvimą. Geras drenažas



Leptotes bicolor, R. Pileičikas

Leptotes bicolor yra būtinas, todėl vazonėlio dugne sudėkite didelius žievės gabalus, o viršuje naudokite smulkesnį substratą. Augalą sodinkite taip, kad substratas siektų vazonėlio viršų, nes *Leptotes bicolor* mėgsta išlipti per kraštus. Taip ji prisiaugina daug orinių šaknų, kurios priauga prie vazonėlio išorės.

Leptotes bicolor laistyti reikia panašiai kaip katlėjas, šviesos turi būti daug, bet niekada tiesioginės saulės, tręšti kaip ir kitas orchidėjas. Šis tas įdomaus: Brazilijoje yra gaminami ledai ir šerbetas, į kurių sudėtį įeina brandintų *Leptotes bicolor* sėklų ankščių ekstraktas. Kalbama, kad skonis panašus į vanilės.

Sėkmingo auginimo.

Ramūnas Pileičikas

Maxillaria tenuifolia

*Kilusi iš Nikaragvos,
Meksikos ši orchidėja primena*



Maxillaria tenuifolia, I. Stanevičius

*žolę savo siaurais,
ilgais, tamsiai žaliais
lapais.*

Žydi pavasario, vasaros laikotarpiu. Tamsiai raudoni žiedai su išmarginta raudonomis dėmėmis gelsva lūpa labai skaniai kvepia kokosais.

Užtenka vos 2 – 3 žiedų, kad visas kambarys pakviptų, tačiau kvapas nėra įkyrus. Suaugęs augalas dažniausiai žydi labai gausiai.

Geriausia šią *Maxillaria* auginti vazone arba krepšelyje, pasodintą į epifitinėms orchidėjoms skirtą substratą. Šakniastiebis auga visada į viršų, todėl galima auginti ir pririštą ant žievės. Jei norite sulaukti žiedų, saulės turėtų gauti daug (galima auginti kartu su katlėjomis), todėl geriausia tinka rytinė, vakarinė ar pietinė palangė.

Temperatūra vidutinė - žiemą vėsiau (apie 20C dieną, naktį šiek tiek vėsiau).



Pražydusią Maxillaria tenuifolia pažinsite iš tolo užuodę stiprų kokosų aromatą

Gausiai laistyti augimo metu, žiemą šiek tiek sausiau, ypač jei temperatūra būna žemesnė.

Pavasarij, kai orai pakankamai atšyla galima nešti ir pakabinti lauke ant medžio šakos arba išnešti į balkoną/šiltnamį. Tačiau reikia nepamiršti, kad lauke greičiau džiūsta substratas, todėl reikia dažniau lieti. *Max. tenuifolia* tarp laistymų substratas turėtų šiek tiek pradžiūti, bet jokių būdu neišdžiūti (plonos šaknys jautrios išdžiūvimui).

Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros vidurio tręšti daugiau azoto turinčiomis trąšomis, vėliau - mažiau azoto, bet daugiau kalio ir fosforo turinčiomis trąšomis. Taip pat kaip ir visoms gumbinėms orchidėjoms galima naudoti natūralią organiką, pavyzdžiui, arklio mėšlą (įmaišant džiovinto į substratą persodinimo metu).

Ignas Stanevičius